








Fonte: Anatomia Orientada para Clínica- Moore

Divisões



Trígono Submental

- Limites
- Inferior: Corpo do hioide
 - Lateral: Ventres direito e esquerdo do músculo digástrico
 - Assoalho: músculos milo-hióideos
 - Ápice: sínfise da mandíbula
 - Base: Hioide




Fonte: Atlas de Anatomia- Netter

- Conteúdo
- Pequenos linfonodos submentuais
 - Pequenas veias que se unem para formar a veia jugular anterior

Trígono Submandibular


- Limites
- Superior: margem inferior da mandíbula
 - Inferior e lateral: ventres anterior e posterior do músculo digástrico
 - Assoalho: músculos milo-hióideo, hioglosso e constritor médio da faringe



- Conteúdo
- Glândula submandibular
 - Linfonodos submandibulares
 - N. hipoglosso
 - Parte da artéria e veia faciais

Trígono Carótico

- Limites
- Superior: Ventre posterior do músculo digástrico
 - Inferior e lateral: margem anterior do músculo ECM
 - Inferior e medial: ventre superior do músculo omo-hióideo




Fonte: Atlas de Anatomia- Netter

- Conteúdo
- Artéria carótida comum e seus ramos
 - Seio carótico
 - Glomo carótico
 - Veia jugular interna
 - Nervo vago
- Circundados pela bainha carótica
- OBS: muitos linfonodos cervicais profundos situam-se ao longo da bainha carótica e da VJI


Trígono Muscular

- Limites
- Ventre superior do músculo omo-hióideo
 - Margem anterior do músculo ECM
 - Plano mediano do pescoço



Fonte: Atlas de Anatomia- Netter

- Conteúdo
- Músculos infra-hióideos
 - Tireóide
 - Paratireóides
 - Laringe



Músculos


Músculos supra-hióideos

- M. milo-hióideo
- M. gênio-hióideo
- M. estilo-hióideo
- M. digástrico (2 ventres)


Constituem o assoalho da boca

Sustentam o hioide formando uma base de ação da língua

Eleva o hioide e a laringe para deglutição e entonação



Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore



Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore

Músculos infra-hióideos

Superficiais


M. esterno-hióideo

M. omo-hióideo (2 ventres)


Profundos

M. esternotireóideo

M. tireo-hióideo



Músculos infra-hióideos






Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore

Fixam o hioide, o esterno, a clavícula e a escápula




Deprimem o hioide e a laringe durante a deglutição e a fala

Artérias







Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore



Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore



Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore

A. carótida comum direita

Começa na bifurcação do tronco braquiocefálico

A. carótida comum esquerda

Começa a partir do arco da aorta

Tem trajeto de 2cm no mediastino superior

Veias

Seio petroso inferior

Veias facial e lingual

Veia faríngea



Veia tireoidea superior

Veia tireoidea média

Veia Jugular Interna

Veia subclávia

Veia braquiocefálica



Fonte: Anatomia Orientada para a Clínica- Moore

Dilatação da
extremidade inferior da
VJI

Bulbo inferior da VJI

Ele possui um par de
válvulas que permitem
o fluxo sanguíneo em
direção ao coração e
impedem o refluxo
para a veia

Nervos

N. cervical transverso (C2 e C3)

Suprem a pele que cobre a região cervical anterior

N. hipoglosso (NC XII)


É o nervo motor da língua

Ramos do nervo glossofaríngeo
(NC IX)


Relacionado principalmente com
a língua e com a faringe

Ramos do nervo vago
(X)

Dá origem aos ramos laríngeo,
faríngeo e cardíaco



Fonte: Atlas de Anatomia- Netter



Fonte: Atlas de Anatomia- Netter