








Relações Anatômicas	
Base	Relacionada ao colo da bexiga
Ápice	Contato com a face superior dos m. esfíncter da uretra e transverso profundo do períneo;
Face anterior muscular	Separada da sínfise púbica pela gordura retroperitoneal no espaço retropúbico;
Face posterior	Relacionada com a ampola do reto;
Faces inferolaterais	Relacionadas com o m. levanteador do ânus.





Lobos	
Istmo da Próstata	Anteriormente à uretra, sendo fibromuscular. As fibras musculares representam a continuação superior do m. esfíncter externo da uretra para o colo da bexiga.
Lobos Direito e Esquerdo da Próstata	Separados pelo istmo e por um sulco longitudinal central, podem ser subdivididos em quatro lóbulos indistintos, definidos por sua relação com a uretra e os ductos ejaculatórios:



Lóbulo inferoposterior	Posterior à uretra e inferior aos ductos ejaculatórios. Esse lóbulo constitui a face da próstata palpável ao exame retal digital
Lóbulo inferolateral	lateral à uretra
Lóbulo superomedial	situado profundamente ao lóbulo inferoposterior, circundando o ducto ejaculatório
Lóbulo anteromedial	situado profundamente ao lóbulo inferolateral, diretamente lateral à parte prostática proximal da uretra.

Os **ductos prostáticos** se abrem principalmente nos seios prostáticos, situados de cada lado do colículo seminal na parede posterior da uretra.

Irrigação

aa. prostáticas são ramos principalmente da **artéria ilíaca interna**, aa. vesicais inferiores, mas também as a. pudenda interna e retal média

Drenagem

As veias se unem no **plexo venoso prostático** entre a cápsula fibrosa e a bainha prostática, drena para as **veias ilíacas internas**. Esse plexo é contínuo com o plexo venoso vesical e comunica-se com o plexo venoso vertebral

