


ÓRGÃOS GENITAIS EXTERNOS FEMININOS

Vulva: constituição

Monte do púbis	Área arredondada de pele, coberta de pelos, sobre a sínfise púbica e o osso púbis adjacente. Ele é formado por uma massa de tecido adiposo subcutâneo.
Lábios maiores do pudendo	São duas pregas longitudinais de pele que se estendem do monte pubiano até o períneo, formando os limites laterais da vulva.
Lábios menores do pudendo	São pregas arredondadas de pele sem pelos e sem tecido adiposo. Circundam e fecham o vestíbulo da vagina.
Clitóris	É uma estrutura erétil parcialmente envolvida pelas extremidades anteriores dos lábios menores. Ele tem uma raiz, um corpo e uma glânde.
Bulbos do vestíbulo	Os bulbos do vestíbulo se localizam a cada lado do vestíbulo e constituem duas massas alongadas de tecido erétil.
Glândulas vestibulares maiores	Situam-se de cada lado do vestíbulo, posterolateralmente ao óstio da vagina e inferiormente à membrana do períneo. Seus ductos se abrem no vestíbulo de cada lado do óstio vaginal.
Glândulas vestibulares menores	São pequenas glândulas situadas no vestíbulo que se abrem nele entre os óstios da uretra e da vagina.



Suprimento arterial e drenagem venosa da vulva

Artérias pudendas internas: Irriga a maior parte da pele, órgãos genitais externos e músculos do períneo.

ARTÉRIAS

→ Emite ramos: artérias labiais e do clitóris

O suprimento arterial ainda é derivado dos ramos pudendos externos superficial e profundo da artéria femoral.


Veias pudendas internas: Recebem drenagem das veias labiais e das veias dorsais profundas, que drenam o clitóris.

VEIAS

Veias pudendas externas: Drenam a pele vulvar para a veia safena magna.

Drenam também o clitóris, recebendo as veias dorsais superficiais, que seguem para a veia safena magna.

Veias acompanhantes da artéria pudenda interna: Recebem drenagem das veias labiais.



Inervação da vulva

Face anterior da vulva (monte púbis, parte anterior dos lábios):

É inervada por derivados do plexo lombar: nervos labiais anteriores, derivados dos nervos ilioinguinal, e o ramo genital do nervo genitofemoral.

Face posterior da vulva:


É inervada por derivados do plexo sacral: o ramo perineal do nervo cutâneo femoral posterior lateralmente e o **nervo pudendo (principal)** centralmente:

Nervo pudendo origina:

- Os nervos labiais posteriores (ramos superficiais terminais do nervo perineal), que suprem os dois terços posteriores dos lábios da vulva.
- Os ramos profundos e musculares do nervo perineal suprem o óstio da vagina e os músculos superficiais do períneo.
- O nervo dorsal do clitóris supre os músculos profundos do períneo e são responsáveis pela sensibilidade do clitóris.

Bulbo do vestíbulo e corpos eréteis do clitóris:

Recebem fibras parassimpáticas através do nervos cavernosos do plexo nervoso uterovaginal.



Drenagem linfática do períneo feminino

Linfonodos inguinais superficiais:

Recebem a linfa da pele do períneo, do monte púbis, do óstio da vagina e do vestíbulo.

Linfonodos inguinais profundos:


Recebem a linfa do clitóris, do bulbo do vestíbulo e dos lábios menores. Podem também drenar diretamente para os linfonodos ilíacos internos.

Linfonodos ilíacos internos ou sacrais:

Recebem a linfa da uretra.

Plexo linfático retal:

Recebe os vasos linfáticos do períneo e da parte inferior dos lábios maiores.



MÚSCULOS DO PERÍNEO FEMININO

M. transverso superficial do períneo:

Sustenta e fixa o corpo do períneo/assoalho pélvico para sustentar as vísceras abdominopélvicas e resistir ao aumento da pressão intra-abdominal.

M. bulboesponjoso:

Sustenta e fixa o corpo do períneo/assoalho pélvico; "esfíncter da vagina"; ajuda na ereção do clitóris (e talvez do bulbo do vestíbulo); comprime a glândula vestibular maior.

M. isquiocavernoso:


Mantem a ereção do clitóris mediante compressão das veias e impulsão do sangue da raiz do clitóris para o corpo do clitóris.

M. Esfíncter externo do ânus:

Constringe o canal anal durante a peristalse; sustenta e fixa o corpo do períneo e o assoalho pélvico.

M. Esfíncter externo da uretra:

Comprime a uretra para manter a continência urinária.



Músculos do espaço profundo:

- M. esfíncter externo da uretra
- M. compressor da uretra
- M. esfíncter uretrovaginal
- Músculo liso

Vistas inferiores